



INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS

Estimados Padres y/o Apoderados

Por medio del siguiente documento informamos a Uds., de las vacunas que serán administradas a sus hijos de 1°, 4°, 5°, y 8° Básico, acorde al Programa Nacional de Inmunizaciones.

Vacunas y su importancia

La manera más efectiva de mantener a su hijo/a sano/a es a través de las vacunas, ya que su función es prevenir enfermedades que pueden llegar a ser peligrosas.

El Ministerio de Salud tiene un Plan Nacional de Inmunizaciones para el control, eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por vacunas (www.minsal.cl). Estas vacunas se administran en forma gratuita porque son adquiridas y enviadas por el Ministerio de Salud y son de carácter obligatorias.

Vacunación Escolar 2017

EDAD	VACUNA	PROTEGE
1° Básico	Dpt (a celular)	Difteria-tétano y tos convulsiva
	Tres vírica	Sarampión – Rubéola - Paperas
4° Básico Niñas	VPH 1° dosis	Virus papiloma humano
5° Básico Niñas	VPH 2° dosis	Virus papiloma humano
8° Básico	Dpt (a celular)	Difteria-tétano y tos convulsiva

Escolares Inasistentes al momento de la vacunación:

Los niños inasistentes se vacunarán los viernes en horario de 9:00 a 12:00 hrs. o 13:30 a 15:00 hrs.

Equipo vacunación Consultorio Quilpué

- **Vacuna Tres Vírica (SRP):** Vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis (paperas). Se coloca a los 12 meses **y en primero básico.**

Reacciones y cuidados: Entre los 5 y 10 días después de administrada la vacuna, puede haber fiebre moderada, romadizo, inflamación de ganglios y pintas rosadas en la piel. Si aparece fiebre, desabrigue al niño/a, adminístrele líquido y paracetamol de acuerdo a la dosis recomendada por su pediatra.

- **Vacuna Dpta :** Es una vacuna que protege de la difteria, tétano y coqueluche o tos convulsiva, y se coloca a los **escolares de 1° y 8° básico.**

Reacciones y cuidados: reacciones esperables, son generalmente leves, como fiebre o dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección.

- **Vacuna VPH:** Previene contra cáncer cérvico uterino y condilomas (verrugas) en la etapa adulta una vez iniciada relaciones sexuales.

Reacciones y cuidados: reacciones esperables son dolor en sitio de punción, enrojecimiento.

Contraindicaciones para recibir vacunación:

* **Reacción adversa grave a una dosis previa de vacuna.** Se consideran como tal a la reacción alérgica grave (anafiláctica) a una dosis que el niño haya recibido con anterioridad a la actual.

* **Hipersensibilidad o reacción alérgica grave a vacunación previa.** Alergia al huevo grave (en relación a la vacuna tres vírica)

* **Embarazo.**

* **Inmunodeficiencias.** Requiere certificado médico para ser vacunado.

* **Enfermedad aguda.** Por un principio de precaución, las vacunas no deben administrarse en el curso de infecciones agudas moderadas y graves, pero solo mientras dure esa situación. Igualmente en los casos de enfermedad aguda, como fiebre muy elevada, crisis asmática, cardiopatía o nefropatía descompensadas, estarán contraindicadas mientras dure la situación aguda. **POR LO GENERAL, EL ESCOLAR ESTA CON LICENCIA MEDICA**

* **Estado febril** al momento de la vacunación

Dudas y consultas diríjelas a coordinadora de salud del establecimiento.

María Eliana Aránguiz Olguín